

ACUM DISPONIBIL!

apoquel[®] *chewable*

(comprimate masticabile cu oclacitinib)

**O NOUĂ FORMĂ DE PREZENTARE -
COMPRIMATE MASTICABILE**

pentru calmarea rapidă și eficientă a
pruritului alergic, cu eficacitate clinică
comparabilă cu Apoquel[®] (oclacitinib
comprimate filmate)*

Apoquel[®] comprimate
masticabile este indicat pentru
tratamentul pruritului asociat cu
dermatita alergică și tratamentul
manifestărilor clinice ale
dermatitei atopice la câini.

*Într-o publicație independentă a unui
studiu de laborator, Apoquel comprimate
masticabile a fost comparabil cu
Apoquel comprimate filmate în ceea
ce privește debutul și instalarea efectului
antipruriginos.

zoetis

Vă prezentăm **primul și singurul** comprimat masticabil nesteroidian pentru prurit alergic

Palatabilitate ridicată, cu acceptare voluntară demonstrată în cadrul unui studiu clinic de teren relizat pe câini cu proprietar¹

>90% din doze au fost acceptate voluntar de către câini cu proprietar, într-un studiu clinic de teren^{1*†}

- Nivelul de acceptare a fost menținut pe tot parcursul terapiei.^{1*†}
 - Rata de acceptare per doză calculată la 14 doze oferite (7 zile, de două ori /zi) a variat între 89,9% și 93,3%, indicând lipsa de aversiune la doze repetate.
- La câinii care au consumat doza întreagă timpul mediu de acceptare a fost de 15 secunde, în cadrul unui studiu de laborator.^{2†}



- Nu s-a dezvoltat aversiune la doză pe perioada tratamentului^{1*}
 - Pe parcursul unui studiu cu dozare multiplă realizat pe 121 de câini, pentru 1673 de doze Apoquel comprimate masticabile administrate, rata de consum integral în decurs de 5 minute, la fiecare dozare, a variat de la 89,9% la 93,3 % la orice moment.

^{*}Un studiu clinic multicentric realizat pe 121 de câini tratați în 10 spitale veterinare din Statele Unite, conceput pentru a evalua palatabilitatea celor 3 forme de prezentare de Apoquel comprimate masticabile pentru tratamentul semnelor clinice asociate cu dermatita alergică și dermatita atopică. Comprimatele masticabile de Apoquel au fost administrate în doză de 0,4-0,6 mg/kg, de două ori pe zi, minimum 7 zile și maxim 14 zile, unor câini cu proprietar. Rata de acceptare voluntară de fost de 91,6%.

[†]Un studiu monocentric pe 25 de câini realizat într-o unitate de cercetare cu câini cazați în țarcuri individuale a evaluat palatabilitatea Apoquel comprimate masticabile. Comprimatele au fost oferite în doză de 0,4-0,6 mg/kg, de două ori pe zi, timp de 7 zile consecutive. Rata de acceptare voluntară a fost de 78,9%.²

O îmbunătățire a experienței de dozare poate înlătura stresul tratamentului pentru câini și proprietarii lor³

Apoquel® comprimate masticabile este o **nouă formulare** cu același regim de dozare ca și Apoquel comprimate filmate

Flexibilitate oferită de opțiunea masticabilă, pentru o administrare facilă, asemănătoare unei recompense.

Greutate corporală (kg) a câinelui	Concentrația și numărul de comprimate care trebuie administrate		
	Apoquel 3,6 mg comprimate	Apoquel 5,4 mg comprimate	Apoquel 16 mg comprimate
3,0-4,4	1/2	-	-
4,5-5,9	-	1/2	-
6,0-8,9	1	-	-
9,0-13,4	-	1	-
13,5-19,9	-	-	1/2
20,0-26,9	-	2	-
27,0-39,9	-	-	1
40,0-54,9	-	-	1½
55,0-80,0	-	-	2

Dozare: 0,4 mg până la 0,6 mg oclacitinib/kg greutate corporală


- De două ori pe zi până la 14 zile, urmată de o administrare pe zi pentru menținere.
- Poate fi administrată cu sau fără hrană.

Ficatul de porc utilizat pentru a aromatiza Apoquel comprimate masticabile este un alergen mai puțin frecvent pentru câinii cu alergii alimentare (2%)⁴



Cu Apoquel® comprimate masticabile **obțineți și mențineți** calmarea pruritului alergic în timp ce diagnosticați cauza inițială a pruritului

- Controlul rapid al pruritului îmbunătățește calitatea vieții, în timp ce excludeți paraziții și infecțiile.
- Timpul scurt de înjumătățire vă permite să controlați pruritul în timpul procesului de diagnosticare sau în cursul evaluării pacientului la alergii față de mediu.
- Apoquel este preferat în cursul dietei de excludere. Având în vedere că un procent foarte mic din câinii cu alergii alimentare ar putea fi alergici la porc (2%), Apoquel comprimate masticabile poate fi luat în considerare în mod excepțional.



*Într-un studiu pe Apoquel comprimate masticabile pe un model canin de prurit indus de IL-31.⁶



Apoquel comprimate masticabile oferă eficacitate comparabilă cu Apoquel comprimate filmate, într-un comprimat masticabil, ușor de administrat



Oclacitinib a fost **special conceput** pentru a ținti pruritul alergic și inflamația la câini⁹

Oclacitinib acționează diferit față de steroizi și ciclosporine⁹⁻¹¹

Selectivitatea oclacitinibului pentru JAK-1 și JAK-3, față de citokinele dependente de JAK-2, arată impactul minim asupra hematopoiezei și funcției imune înnăscute

Blocarea JAK 1 și JAK 3	Efect minim asupra JAK 2
	
Oclacitinib inhibă funcția unei varietăți de citokine proinflamatoare și cu rol în răspunsul pruritogen, inclusiv a celor dependente de JAK1 și JAK3, implicate în alergii la câine	Cu efect minim asupra citokinelor dependente de JAK2, implicate în hematopoieză și imunitatea înnăscută

Alegeți Apoquel® comprimate masticabile ca **primă intenție** pentru calmarea rapidă și eficientă a pruritului alergic

Îmbunătățiți calitatea vieții câinilor alergici și a proprietarilor acestora

- Palatabilitate ridicată, demonstrată prin acceptarea voluntară de către câini alergici^{*1*}
- Calmare rapidă a pruritului alergic, în ≤3 ore⁶
- Mod de acțiune diferit față de steroizi și ciclosporine⁹⁻¹¹

^{*}Într-un studiu clinic de teren, pe câini cu proprietar¹



Acum aveți **mai multe opțiuni** ca niciodată să calmați pruritul pacienților voștri

Tratament rapid, eficient pentru pruritul alergic

apoquel[®]
chewable
(oclacitinib comprimate masticabile)

apoquel[®]
(oclacitinib comprimate filmate)

- Dozare flexibilă prin intermediul unui comprimat masticabil sau unui comprimat filmat
- Calmare rapidă a pruritului
- Reducere semnificativă a inflamației⁶
- Controlul pruritului (pornit/oprit) în timpul procesului de stabilire a diagnosticului⁸
- Managementul episoadelor pruriginoase
- Management pe termen scurt sau lung al pruritului alergic
- Pentru câini ≥12 luni și >3 kg

Flexibilitatea celor 2 formulări permite dozare personalizată în funcție de nevoile individuale ale pacientului

Tratament pe termen lung

CYTOPOINT[®]
(lokivetmab)

- Calmarea pruritului alergic începe în decurs de 24 de ore
- Pretabil în cazurile în care nu există complianță din partea proprietarului
- Câini cu comorbidități
- Proprietari care caută terapie fără medicamente
- Managementul pruritului cronic
- Pentru câini de toate vârstele

Oferă tratament personalizat pentru dermatitele alergice și atopice cu 3 opțiuni de tratament de încredere

Indicații Cytopoint[®]

- Tratamentul pruritului asociat dermatitei alergice la câini.
- Tratamentul manifestărilor clinice ale dermatitei atopice la câini.

Indicații Apoquel[®]

- Tratamentul pruritului asociat cu dermatita alergică la câini.
- Tratamentul manifestărilor clinice ale dermatitei atopice la câini.

References: 1. Data on file, Study No. A163C-US-19-A40, 2019, Zoetis Inc. 2. Data on file, Study No. A163C-NL-19-A57, 2019, Zoetis Inc. 3. Data on file, Apoquel[®] chewable Market Research, 2021, Zoetis Inc. 4. Mueller RS, Olivry T, Prélud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): common food allergen sources in dogs and cats. *BMC Vet Res.* 2016;12:9. doi:10.1186/s12917-016-0633-8. 5. Aleo MM, Galvan EA, Fleck TJ, et al. Effects of oclacitinib and prednisolone on skin test sensitivity [abstract]. *Vet Dermatol.* 2013;24(3):297. 6. Data on file, Study No. A162R-US-20-B05, 2020, Zoetis Inc. 7. Cosgrove SB, Wren JA, Cleaver DM, et al. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with canine allergic dermatitis. *Vet Dermatol.* 2013;24(5):479-e114. doi:10.1111/vde.12047. 8. Cosgrove SB, Wren JA, Cleaver DM, et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of the efficacy and safety of the Janus kinase inhibitor oclacitinib (Apoquel[®]) in client-owned dogs with atopic dermatitis. *Vet Dermatol.* 2013;24(6):587-e142. doi:10.1111/vde.12088. 9. Gonzales AJ, Bowman JW, Fici GJ, et al. Oclacitinib (Apoquel[®]) is a novel Janus kinase inhibitor with activity against cytokines involved in allergy. *J Vet Pharmacol Ther.* 2014;37(4):317-324. doi:10.1111/jvp.12101. 10. Coutinho AE, Chapman KE. The anti-inflammatory and immunosuppressive effects of glucocorticoids, recent developments and mechanistic insights. *Mol Cell Endocrinol.* 2011;335(1):2-13. doi:10.1016/j.mce.2010.04.005. 11. Guaguère E, Steffan J, Olivry T. Cyclosporin A: a new drug in the field of canine dermatology. *Vet Dermatol.* 2004;15(2): 61-74. doi:10.1111/j.1365-3164.2004.00376.x.

All trademarks are the property of Zoetis Services LLC or a related company or a licensor unless otherwise noted.
© 2022 Zoetis Services LLC. All rights reserved. MM-21836