

CYTOPOINT.

ÎMPREUNĂ ASIGURĂM
CONTROLUL EFICIENT
AL PRURITULUI LA CÂINI

apoquel

Eu
Deja **NU** mă
mai
șcarpin



zoetis™

Eu
Deja **NU** mă
mai
scarpin



CONTROLUL
PRURITULUI

ELIMINAREA
PARAZIȚILOR

TRATAMENTUL
INFECȚIILOR
CUTANATE

INIȚIEREA
DIETEI DE
EXCLUDERE

CONFIRMAREA
DERMATITEI
ATOPICE

apoquel
oclacitinib

Ameliorare rapidă
a simptomelor

 **Simparica**

Controlul pruritului în perioada
terapiei de excludere, cu:

convenia[®]

apoquel
oclacitinib și/sau **CY'TOPOINT**[®]

apoquel
oclacitinib și/sau

CY'TOPOINT[®]

Management terapeutic
pe termen lung sau
utilizare în cazurile
cronice

CONTROLUL
PRURITULUI

ELIMINAREA
PARAZIȚILOR

TRATAMENTUL
INFECȚIILOR
CUTANATE

INIȚIEREA
DIETEI DE
EXCLUDERE

CONFIRMAREA
DERMATITEI
ATOPICE

apoquel

AMELIORAREA PRURITULUI DIN PRIMA ZI DE TRATAMENT



Efect rapid,
permițând astfel
**oprirea sau inițierea
terapiei ori de câte
ori este necesar**

pentru **efectuarea evaluărilor din
timpul terapiei de excludere** (de
ex.: purici, alergie alimentară)



Eficacitate dovedită
în **ameliorarea
inflamației cutanate**

În cadrul unui studiu s-a demonstrat că
Apoquel **prezintă eficacitate similară** similară
cu corticosteroizii **în ameliorarea inflamației
cutanate**¹



**Profil de
siguranță bun**
comparativ cu grupul
placebo²



**Utilizare
concomitentă**
Nu s-au observat
interacțiuni
farmacologice

în studiile de teren
unde oclacitinib a fost
**administrat concomitent
cu produse medicinale
veterinare**, precum
endo- și ectoparaziticide,
antimicrobiene și
antiinflamatoare.



**Apoquel este alegerea potrivită pentru
tratamentul pruritului asociat cu
dermatita alergică la câini cu vârstă
mai mare de 12 luni***

Reducerea **rapidă și eficientă a pruritului** poate îmbunătăți în mare
măsură **calitatea vieții** câinilor afectați și a proprietarilor acestora².

*și cu greutatea peste 3 kg

¹ Efectele antiinflamatorii ale oclacitinibului asupra scorurilor leziunilor cutanate într-o colonie de câini beagle, sensibilă la acarianul prafului. J. T. ROSS*, K. RUDOLPH†, J. MLECZKO†, T. BARRETT†, A. J. GONZALES*.

* Cercetare terapeutică globală, Zoetis, Kalamazoo, Michigan, Statele Unite ale Americii. † Lovelace Biomedical, Albuquerque, New Mexico, Statele Unite ale Americii; afiș prezentat la WCVD 11SEP20.

² Cosgrove SB, Wren JA, Cleaver DM, et al. Eficacitatea și siguranța oclacitinibului pentru combaterea pruritului și a leziunilor cutanate asociate la câinii cu dermatită alergică canină. Dermatol veterinar. 2013; 24(5): 479-487. doi: 10.1111/ vde.12047.

zoetis


EXCLUDEREA ALERGIEI ALIMENTARE PRIN INTERMEDIUL UNEI DIETEI DE ELIMINARE



Menținerea stării de confort a pacientului prin ameliorarea pruritului pe perioada dietei de excludere, va preveni agravarea afecțiunilor cutanate asigurând astfel consolidarea relației cu proprietarul și complianța la tratament.²

Proprietarii pot refuza sau renunța la dieta de eliminare în cazul în care pruritul nu este controlat corespunzător.

Inițiând controlul pruritului cu CYTOPOINT și continuând cu APOQUEL reprezintă o abordare terapeutică corectă, perioadă în care se recomandă și efectuarea dietei de eliminare (6 până la 12 săptămâni)



CYTOPOINT ESTE O ALEGERE SIGURĂ PENTRU
MANAGEMENTUL PE TERMEN LUNG AL PRURITULUI DE
NATURĂ ALERGICĂ

În special pe **perioada dietei de eliminare** când recompensele
(în care de multe ori se ascund medicamentele orale) **nu sunt permise**

CONTROLUL
PRURITULUI

ELIMINAREA
PARAZIȚILOR

TRATAMENTUL
INFECȚIILOR
CUTANATE

INIȚIEREA
DIETEI DE
EXCLUDERE

CONFIRMAREA
DERMATITEI
ATOPICE

CYTOPOINT[®]
apoquel[®]

DERMATITA ATOPICĂ SE CONFIRMĂ DUPĂ ELIMINAREA PRURITULUI DECLANȘAT DE ALȚI FACTORI ETIOLOGICI

CYTOPOINT[®]
lokivetmab

CYTOPOINT CU ACȚIUNEA SA PRELUNGITĂ
ESTE UN TRATAMENT DE ELECCIE
PENTRU CÂINII CU DERMATITĂ ATOPICĂ



4
SĂPTĂMÂNI

CYTOPOINT, printr-o **singură injecție** oferă **calmarea rapidă și eficientă a pruritului timp de 4 săptămâni**, asigurând astfel mediul optim pentru regenerarea cutanată. Ca rezultat al diminuării pruritului, **se îmbunătățește atât calitatea vieții** câinilor cu dermatită atopică, cât și a stăpânilor acestora.



CYTOPOINT oferă medicilor veterinari o paletă largă de oportunități privind monitorizarea procesului patologic, tratarea infecțiilor secundare, îmbunătățirea terapiei locale și antiparazitare **reducând astfel costurile terapiei** pe termen lung comparativ cu alte metode de tratament.^{1,2}

apoquel[®]
oclacitinib



APOQUEL sub formă de comprimate cu administrare zilnică este ideal pentru **tratamentul dermatitei atopice**, în cazurile în care proprietarul preferă **să administreze produsul medicinal veterinar la domiciliu**.

Discutarea opțiunilor și **decizia asupra tratamentului se face împreună cu proprietarul.**

1. Outcomes Research, Zoetis US Operations, Parsippany, NJ, Veterinary Professional Services, Zoetis US Operations, Parsippany NJ.
2. K. Mwacalimba, A. Hillier and D. Amodie. Poster Abstract World Congress of Veterinary Dermatology. NAVDF 2017.



TERAPIE BIOLOGICĂ

Anticorpi monoclonali
caninizați anti-IL31



IMPACT MINIM ASUPRA FICATULUI ȘI RINICHILOR

Se descompune similar proteinelor naturale



CONTROLAT DE MEDICII VETERINARI

	CYTOPOINT. lokivetmab	
Mecanism de acțiune	Terapie de înaltă precizie. Neutralizează interleukina 31 (IL-31) canină.	
Eficacitate	În cadrul unui studiu de laborator, lokivetmab a demonstrat debutul eficacității împotriva pruritului la 8 ore după tratament, timp de o lună.	
Siguranță	• Fără restricții la utilizarea în caz de afecțiuni concomitente. • Eliminare pe căi naturale, similare cu descompunerea proteinelor, cu afectare minimă a ficatului sau rinichilor¹. • Se poate administra la câini de orice vârstă cu greutatea peste 3 kg.	
Compatibilitate	• Nu au fost observate interacțiuni farmacologice în studiile de teren în care lokivetmab a fost administrat concomitent cu produse medicinale veterinare precum endo- și ectoparaziticide, antimicrobiene, antiinflamatoare și vaccinuri. • Posibilitatea de administrare a vaccinurilor inclusiv în ziua tratamentului. În cazul în care se administrează alt(e) vaccin(uri) în același timp cu tratamentul cu lokivetmab, acesta(acestea) trebuie administrat(e) într-o zonă diferită.	
Interferează cu diagnosticul	Nu interferează cu diagnosticul	

CYTOPOINT.
lokivetmab



ADMINISTRARE INJECTABILĂ LUNARĂ

PENTRU PROPRIETARI CARE
PREFERĂ SĂ NU ADMINISTREZE
PRODUSE MEDICINALE
VETERINARE ÎN FIECARE ZI,
CREȘTE COMPLIANȚA LA TRATAMENT



PENTRU MEDICII VETERINARI
CARE PREFERĂ SĂ
CONTROLEZE ADMINISTRAREA
ȘI GARANTEAZĂ O MONITORIZARE MAI
BUNĂ A BOLII

PENTRU GESTIONAREA
CAZURILOR ACUTE,
SEZONIÈRE SAU
CRONICE





PRIMA INTENȚIE

AMELIORAREA
pruritului



TRATAMENT PRECOCE

de la **prima prezentare**
a pacientului



ESENȚIAL ÎN PROCESULUI DE DIAGNOSTIC

administrarea și întreruperea tratamentului în
mod **strategic**

apoquel oclacitinib		GLUCOCORTICOSTEROIZI
Specific: Inhibitor selectiv al enzimelor Janus-kinază (JAK).		Mecanism de acțiune nespecific⁷.
● O singură doză de oclacitinib a demonstrat debutul acțiunii mai rapid decât prednisolon pe cale orală și a produs o reducere majoră a pruritului comparativ cu prednisolon sau dexametazonă pe cale injectabilă¹. ● Apoquel acționează deja după 1 până la 3 ore după prima doză¹.		comparativ cu Apoquel ¹ .
● Fără efecte secundare asociate în mod obișnuit corticosteroizilor.		Efecte adverse pe termen scurt (polidipsie, poliurie, polifagie) și pe termen lung asupra a numeroase organe ^{3,4} .
● Nu au fost observate interacțiuni farmacologice în studiile de teren în care oclacitinib a fost administrat concomitent cu produse medicinale veterinare precum endo- și ectoparaziticide, antimicrobiene și antiinflamatoare.		● Poate interfera cu vaccinul. ● Nu trebuie să se administreze împreună cu AINS^{5,6}.
Nu interferează cu testele de sensibilitate intradermică comparativ cu prednisolon ² .		Interferență cu testele de sensibilitate intradermică².

apoquel
oclacitinib

ADMINISTRARE
SUB FORMĂ DE COMPRIATE ZILNICE



APOQUEL, DATORITĂ DEBUTULUI RAPID,
ESTE FOARTE UTIL ÎN GESTIONAREA
EXACERBĂRILOR PRURITULUI LA CÂINII
CU DERMATITĂ ALERGICĂ SAU
DERMATITĂ ATOPICĂ

APOQUEL ESTE CEA MAI BUNĂ OPȚIUNE PENTRU
CÂINII ADULȚI ALERGICI
CU VÂRSTA DE PESTE 12 LUNI
ȘI GREUTATEA DE PESTE 3 KG

+12



PENTRU GESTIONARE
PE TERMEN SCURT
ȘI LUNG



1. Andrea J. Gonzales, Timothy J. Fleck, William R. Humphrey, Betsy A. Galvan, Michelle M. Aleo, Sean P. Mahabir, Jezanah-Kira Tena, Karen G. Greenwood and Robert B. McCall; IL-31-induced pruritus in dogs: a novel experimental model to evaluate anti-pruritic effects of canine therapeutics; Vet Dermatol 2016; 27: 34-e10; DOI: 10.1111/vde.12280. 2. Aleo MM, Galvan EA, Fleck JT, et al. Effects of oclacitinib and prednisolone on skin test sensitivity [abstract]. Vet Dermatol. 2013;24(3):297. 3. Sousa CA. Glucocorticoids in veterinary dermatology. In: Bonagura JD, Twedt DC, eds. Kirk's Current Veterinary Therapy. 14th ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2009:400-404. 4. Aiello SE, Moses MA, eds. The Merck Veterinary Manual. Whitehouse Station, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp.; 2013. http://www.merckmanuals.com/vet/pharmacology/antiinflammatory_agents/corticosteroids.html?qt=anti-inflammatory+agents&alt=sh. Accessed October 21, 2013. 5. Spontaneous gastroduodenal perforation in 16 dogs and seven cats (1982-1999). Hinton LE, McLoughlin MA, Johnson SE, et al. JAAHA 38:176-187, 2002. 6. Gastrointestinal tract perforation in dogs treated with a selective cyclooxygenase-2 inhibitor: 29 cazuri (2002-2003). Lascelles BD, Blikslager AT, Fox SM, et al. JAVMA 227:1112-1117, 2005. 7. David Sanmiguel Poveda, Optimizando la terapia con glucocorticoides en dermatología veterinaria. Conociendo los efectos adversos. Clindervet, Revista clínica de dermatología veterinaria, 2018, vol 5, pag 27-39.

Eu
Deja Nu mă
mai
scarpin



CYTOPOINT 10 mg soluție injectabilă pentru câini - **CYTOPOINT 20 mg** soluție injectabilă pentru câini - **CYTOPOINT 30 mg** soluție injectabilă pentru câini - **CYTOPOINT 40 mg** soluție injectabilă pentru câini. **COMPOZIȚIE:** Fiecare flacon de 1 ml conține: CYTOPOINT 10 mg: Lokivetmab 10 mg. CYTOPOINT 20 mg: Lokivetmab 20 mg. CYTOPOINT 30 mg: Lokivetmab 30 mg. CYTOPOINT 40 mg: Lokivetmab 40 mg. **Indicații pentru utilizare:** Tratamentul pruritului asociat dermatitei alergice la câini. Tratamentul manifestărilor clinice ale dermatitei atopice la câini. **CONTRAINDICAȚII:** Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Nu se utilizează la câinii cu greutate corporală mai mică de 3 kg. **PRECAUȚII:** Când tratați pruritul asociat dermatitei alergice cu lokivetmab, investigați și tratați orice etiologie de fond (de exemplu, dermatităergică la purici, dermatită de contact, hipersensibilitate alimentară). Se recomandă monitorizarea câinilor pentru infecții bacteriene asociate cu dermatita atopică, în special în timpul primelor săptămâni de tratament. Auto-injecția accidentală poate avea ca rezultat un răspuns imun la lokivetmab. Nu este așteptat ca acest lucru să determine reacții adverse, cu toate acestea, autoadministrarea repetată poate crește riscul reacțiilor de hipersensibilitate. În caz de auto-injecție accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. **Precauții speciale pentru depozitare:** A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumină. A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă după EXP. Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: a se utiliza imediat. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. **ELIMINAREA:** Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. **DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** Zoetis Belgium SA. Produs medicinal veterinar supus eliberării cu rețetă veterinară. **NUMERELOR AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** EU/2/17/205/001-012.

Apoquel 3,6 mg, comprimate filmate pentru câini. **Apoquel 5,4 mg**, comprimate filmate pentru câini. **Apoquel 16 mg**, comprimate filmate pentru câini. **COMPOZIȚIE:** Fiecare comprimat filmat conține: **Apoquel 3,6 mg:** 3,6 mg oclacitinib. **Apoquel 5,4 mg:** 5,4 mg oclacitinib. **Apoquel 16 mg:** 16 mg oclacitinib. **INDICAȚII PENTRU UTILIZARE:** Tratamentul pruritului asociat cu dermatitaergică la câini. Tratamentul manifestărilor clinice ale dermatitei atopice la câini. **CONTRAINDICAȚII:** Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Nu se utilizează la câinii cu vârstă mai mică de 12 luni sau cu greutate corporală mai mică de 3 kg. Nu se utilizează la câinii cu semne de supresie imună, cum ar fi hiperadrenocorticism sau cu semne de neoplazie malignă progresivă, întrucât substanța activă nu a fost evaluată în aceste cazuri. **PRECAUȚII SPECIALE:** Oclacitinib modulează sistemul imunitar și poate crește susceptibilitatea la infecții și exacerba afecțiunile neoplazice. Câinii cărora li se administrează comprimatele de Apoquel trebuie, prin urmare, monitorizați în privința dezvoltării infecțiilor și a neoplaziei. Când se tratează pruritul asociat dermatitei alergice cu oclacitinib, investigați și tratați orice cauze de fond (de exemplu, dermatitaergică la înțepătura de purici, dermatita de contact, hipersensibilitatea alimentară). De asemenea, în caz de dermatităergică sau dermatită atopică, este recomandat a se investiga și trata factorii de complicare, cum ar fi infecțiile/inestațiile bacteriene, fungice sau parazitare (de exemplu, purici sau răie). Considerând potențialul de efecte asupra anumiți parametri clinicopatologici (vezi secțiunea Reacții adverse), se recomandă monitorizarea periodică a hemoleucogramei complete și biochimiei serice, atunci când câinii sunt în tratament de lungă durată. Spălați mâinile după administrare. În caz de ingestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. **Precauții speciale pentru depozitare:** A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C. Orice jumătate de comprimat rămasă trebuie pusă înapoi în blisterul deschis și depozitată în cutia de carton originală sau în flaconul de PEID (pentru maximum 3 zile). **ELIMINAREA:** Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. **DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** Zoetis Belgium SA. Produs medicinal veterinar supus eliberării cu rețetă veterinară. **NUMERELOR AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** EU/2/13/154/001-027.

Convenia 80 mg/ml, pulbere și solvent pentru soluție injectabilă pentru câini și pisici **COMPOZIȚIE:** soluția injectabilă reconstituită conține: 80,0 mg/ml cefovecin (ca sare sodică)

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE: A se utiliza numai în cazul următoarelor infecții ce necesită tratament prelungit. În urma administrării unice acțiunea antimicrobiană a produsului Convenia are o durată de până la 14 zile. Câinii: Pentru tratamentul infecțiilor pielii și a țesuturilor moi incluzând piodermite, plăgi și abcese asociate cu *Staphylococcus pseudintermedius*, *Streptococci* beta-haemolitici, *Escherichia coli* și/sau *Pasteurella multocida*. Pentru tratamentul infecțiilor tractului urinar asociate cu *Escherichia coli* și/sau *Proteus* spp. Ca tratament adjuvant în terapia parodontală mecanică sau chirurgicală, în tratamentul infecțiilor grave ale gingiilor și țesuturilor parodontale asociate cu *Porphyromonas* spp. și *Prevotella* spp. (a se vedea și secțiunea Precauții speciale pentru utilizare). Pisici: Pentru tratamentul abceselor și plăgilor pielii și a țesuturilor moi asociate cu *Pasteurella multocida*, *Fusobacterium* spp., *Bacteroides* spp., *Prevotella oralis*, *Streptococci* beta-haemolitici, și/sau *Staphylococcus pseudintermedius*. Pentru tratamentul infecțiilor tractului urinar asociate cu *Escherichia coli*. **CONTRAINDICAȚII:** Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la antibioticele cefalosporine sau peniciline. Nu se utilizează pentru erboarele de talie mică (incluzând porci de Guineea și iepuri). Nu se utilizează pentru câinii și pisicile cu vârsta mai mică de 8 săptămâni de viață. **PRECAUȚII SPECIALE:** Este prudent ca, cefalosporinele din generația a III-a să fie rezervate pentru tratamentul stărilor clinice care au avut un răspuns clinic slab, sau se așteaptă să răspundă slab la alte clase de antimicrobiene sau la cefalosporine de primă generație. Utilizarea produsului trebuie să se facă pe baza testelor de susceptibilitate și luând în considerație politicile antimicrobiene oficiale și locale. Cerința fundamentală în tratamentul afecțiunilor parodontale este intervenția mecanică și / sau chirurgicală a medicului veterinar. Siguranța produsului Convenia nu a fost evaluată în cazul animalelor suferind de disfuncții renale severe. Piodermita este de obicei secundară unei afecțiuni primare. Prin urmare, este recomandabil să se determine cauza primară și să se trateze animalul corespunzător. Se va acționa cu atenție în cazul pacienților ce au prezentat anterior reacții de hipersensibilitate la cefovecin, alte cefalosporine, peniciline sau alte medicamente. Dacă apare o reacțieergică, nu se vor mai administra alte doze de cefovecin și trebuie instituită o terapie corespunzătoare față de hipersensibilitatea la beta-lactami. Reacțiile grave de hipersensibilitate acută pot necesita tratamentul cu epinefrină și alte măsuri de urgență, incluzând oxigen, fluide administrate intravenos, antihistaminice administrate intravenos și urmărirea căilor respiratorii atât timp cât starea clinică o indică. Medicii veterinari trebuie să fie conștienți că reapariția simptomelor alergice poate apărea atunci când tratamentul simptomatic este întrerupt. Penicilinele și cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate conduce la sensibilitate încrucișată la cefalosporine și vice versa. Reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi ocazional grave. Nu manipulați acest produs dacă știți că sunteți sensibilizat sau v-a fost recomandat să nu lucrați cu astfel de preparate. Manipulați produsul cu atenție pentru a evita expunerea, luând toate măsurile de precauție recomandate. Dacă observați apariția de simptome ca urmare a expunerii cum ar fi, mâncărimi ale pielii, trebuie să solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului. Umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultate în respirație sunt simptome mult mai serioase și necesită îngrijire medicală de urgență. Dacă știți că sunteți alergic la peniciline sau cefalosporine, evitați contactul cu resturile contaminate. În cazul unui eventual contact spălați pielea cu apă și săpun. **Precauții speciale pentru depozitare:** A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a se proteja de lumină. **ELIMINAREA:** Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. **DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** Zoetis Belgium SA. Produs medicinal veterinar supus eliberării cu rețetă veterinară. **NUMERELOR AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** EU/2/06/059/001-002

Simparica 5 mg comprimate masticabile pentru câini 1,3-2,5 kg; **Simparica 10 mg** comprimate masticabile pentru câini >2,5-5 kg; **Simparica 20 mg** comprimate masticabile pentru câini >5-10 kg; **Simparica 40 mg** comprimate masticabile pentru câini >10-20 kg; **Simparica 80 mg** comprimate masticabile pentru câini >20-40 kg; **Simparica 120 mg** comprimate masticabile pentru câini >40-60 kg; **COMPOZIȚIE:** Fiecare comprimat conține: sarolaner 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg, 120 mg. **INDICAȚII PENTRU UTILIZARE:** Pentru tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus* și *Rhipicephalus sanguineus*). Produsul medicinal veterinar are activitate imediată de ucidere a căpușelor și persistentă timp de până la cel puțin 5 săptămâni. Pentru tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides felis* și *Ctenocephalides canis*). Produsul medicinal veterinar are activitate imediată de ucidere a puricilor și persistentă împotriva noilor infestații, timp de până la cel puțin 5 săptămâni. Produsul medicinal veterinar poate fi folosit ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (FAD). Pentru tratamentul răiei sarcoptice (produsă de *Sarcoptes scabiei*). Pentru tratamentul infestațiilor auriculare cauzate de acarieni (*Otodectes cynotis*). Pentru tratamentul demodicozelor (*Demodex canis*). Puricii și căpușele trebuie să se atașeze de gazdă și să înceapă să se hrănească, pentru a fi expuși la substanța activă. **CONTRAINDICAȚII:** Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. **PRECAUȚII SPECIALE:** În absența datelor disponibile, tratamentul câinelor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni și/sau sub 1,3 kg greutate corporală trebuie efectuat numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil. Ingerarea accidentală a produsului poate avea ca rezultat efecte adverse, cum ar fi semne neurologice, excitații tranzitorii. Pentru a preveni accesul copiilor la produs, se va scoate numai un singur comprimat masticabil din blister și numai când este necesar. Blisterul trebuie reintrodus imediat, în cutia de carton și aceasta nu trebuie depozitată la vederea și îndemâna copiilor. În cazul unei ingerări accidentale, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. **PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:** Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. **ELIMINAREA:** Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. **DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** Zoetis Belgium SA. Produs medicinal veterinar supus eliberării cu rețetă veterinară. **NUMERELOR AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:** EU/2/15/191/001-018